

ANTIBIOPROPHYLAXIE

INFECTION INVASIVE À MENINGOCOQUE



En cas de tension d'approvisionnement en **RIFAMPICINE**
des solutions alternatives à la prescription de
rifampicine existent :



ANTIBIOPROPHYLAXIE D'URGENCE*

— POUR QUI ? —

Toute personne ayant été exposée
directement aux
sécrétions rhino-pharyngées
d'un cas dans les 10 jours
précédant son hospitalisation

— QUAND ? —

A instaurer dans les 24 à 48 heures
suivant le diagnostic –
l'antibioprophylaxie n'a plus d'intérêt
au-delà de 10 jours
après le dernier contact avec le cas

CIPROFLOXACINE (PER OS)

OU

CEFTRIAXONE (VOIE IV)

Chez l'adulte — DOSE UNIQUE 500MG —

Chez l'adulte — DOSE UNIQUE 250MG —

Chez l'enfant — DOSE UNIQUE 20MG/KG —
sans dépasser 500mg

Chez l'enfant — DOSE UNIQUE 125MG —



SCHEMA POSOLOGIQUE CIPROFLOXACINE 500MG/5ML SUSP.BUVABLE A RECONSTITUER



Poids corporel (kg)	Posologie enfant : 20mg/kg
9-20kg	½ cuillère-mesure graduée ou utilisation d'une <u>seringue orale</u> à usage unique de 5 mL
21-29kg	1 cuillère-mesure (dose.max)



1 cuillère = 500mg = 5 mL



Risque de photosensibilité
Eviter l'exposition solaire
Utilisation d'une crème solaire

*Instruction du 27/07/2018 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque


RAPPEL DES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

VACCINATION

DESINFECTION
DES MAINS



PORT DU
MASQUE



Eviter la
dissémination
de gouttelettes
respiratoires

RECOMMANDATIONS VACCINALES MENINGOCOQUES CHEZ L'ENFANT

SEROGROUPE C

NEISVAC[®]

Obligatoire depuis 2018

1ère dose à 5 mois

Rappel à 12 mois

NB : intervalle de 6 mois entre les 2 doses

SEROGROUPE A,C,W ET Y

NIMENRIX[®]

Obligatoire à partir de janvier 2025*

1ère dose à 6 mois

Rappel à 12 mois

NB : Dose de rappel possible
avec le vaccin **MENQUADFI[®]**

Recommandé à partir de 12 mois jusqu'à 24
ans révolus si pas de primo-vaccination
(dose unique)

Recommandé entre 11 et 14 ans
indépendamment du statut vaccinal
(dose unique)
+ rattrapage possible chez les 15-24 ans

SEROGROUPE B

BXSERO[®]

Recommandé depuis 2021

1ère dose à 3 mois

2e dose à 5 mois

Rappel à 12 mois

SEROGROUPE B

BXSERO[®]

Obligatoire à partir de janvier 2025*

1ère dose à 3 mois

2e dose à 5 mois

Rappel à 12 mois

NB : Vaccination contre le sérotype B non élargie à tous les adolescents

*HAS : stratégie vaccinale de mars 2024