

Vaccins à virus vivants atténués (3^{ème} génération), suspension injectable de 0,5 mL, flacon unidose

SCHÉMAS DE VACCINATION À EFFECTUER CHEZ LES PERSONNES ÉLIGIBLES À LA VACCINATION


Schémas de vaccination, selon antécédents d'infection et vaccination


Immunocompétentes

Immunodéprimées

Personnes éligibles à la vaccination	Vaccinées dans l'enfance (avant 1 980)	Non vaccinées dans l'enfance (avant 1 980)	Vaccinées dans l'enfance (avant 1 980)	Non vaccinées dans l'enfance (avant 1 980)
N'ayant jamais été vaccinées avec un vaccin MVA-BN	1 dose de rappel	2 doses	3 doses	3 doses
Ayant reçu une seule dose de vaccin MVA-BN	Aucun	1 dose	2 doses	2 doses
Avec un schéma complet de vaccination de MVA-BN, à distance de la primovaccination soit, dans la situation actuelle, deux ans environ après la dernière dose.	Aucun	1 dose de rappel	1 dose de rappel	1 dose de rappel
Ayant contracté le MPOX entre 2022 et aujourd'hui	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

CONSERVATION :

Conditions stockage	Temps décongélation	Après décongélation : conservation entre +2° et +8°C, abri lumière
-80°C +/-10°C, à l'abri de la lumière 	10 min environ	Conservation 56 jours (8 semaines) à l'abri de la lumière sans dépasser la date de péremption à -20°C inscrite sur la boîte Conservation 14 jours (2 semaines) , à l'abri de la lumière si la date de péremption en -20°C est dépassée, sans dépasser la date de péremption à -80°C

 Indiquer la date de péremption sur les boîtes et les flacons dès sortie du congélateur. Transport entre 2°C et 8°C, à l'abri de la lumière.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Dermatite atopique → risque de symptômes locaux-régionaux plus marqués
- Hyperthermie → différer l'injection
- Eviter l'administration si grossesse ou allaitement par précaution, faute de données suffisantes
- Eviter l'administration concomitante avec d'autres vaccins ou immunoglobulines

CONTRE INDICATIONS :

- Hypersensibilité à :
- Trométamol
 - Protéines de poulet
 - Benzonase
 - Gentamicine
 - Ciprofloxacine

MODALITÉS D'ADMINISTRATION :



Tourner délicatement le flacon avant utilisation jusqu'à atteindre la température ambiante.



Inspecter visuellement la suspension avant administration : en cas de présence de particules et/ou d'aspect anormal, le vaccin ne doit pas être administré et doit être éliminé.



Administrer 0,5mL par voie SC (voie intravasculaire contre indiquée), aiguille 25G 16mm

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DE LÉGERS À MODÉRÉS :

Douleur au point d'injection, céphalées, fièvre
→ privilégier la prise de paracétamol

Effets indésirables à déclarer via :

[Portail de signalement des événements sanitaires indésirables](#)