

RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES

SYNTHÈSE

Choix et durées d'antibiothérapie préconisées dans les infections bactériennes courantes

Validée par le Collège le 15 juillet 2021

Mise à jour août 2024

Cette fiche de synthèse mentionne l'antibiothérapie de 1^{ère} intention et sa durée préconisée dans les infections bactériennes courantes de ville.

- Infections urinaires de la femme
- Infections ORL de l'enfant et de l'adulte
- Infections bactériennes cutanées
- Infection par *Helicobacter pylori* chez l'adulte
- Diverticulite aiguë sigmoïdienne non compliquée
- Urétrites et cervicites non compliquées
- Infections respiratoires basses [2024] : Coqueluche, Exacerbation de BPCO (EABPCO)

Des fiches détaillées et complètes par infection bactérienne sont disponibles sur www.has-sante.fr

Infections urinaires de la femme

Cystite aiguë simple (aucun facteur de risque de complication)	
fosfomycine-trométamol	Prise unique
Cystite aiguë à risque de complications (au moins 1 facteur de risque)	
Traitement probabiliste (adaptation secondaire systématique à l'antibiogramme) nitrofurantoïne ¹	7 jours
Traitement adapté à l'antibiogramme amoxicilline	7 jours
Cystite aiguë récidivante (au moins 4 épisodes pendant une période de 12 mois)	
Le traitement curatif d'un épisode de cystite récidivante est celui d'une cystite	
Antibioprophylaxie si au moins 1 épisode par mois fosfomycine-trométamol	Prise unique : <ul style="list-style-type: none"> • tous les 7 jours au maximum • dans les 2 heures avant ou après le rapport sexuel si cystites post-coïtales
OU triméthoprime	<ul style="list-style-type: none"> • 150 mg par jour (1 fois par jour maximum, au coucher) • dans les 2 heures avant ou après le rapport sexuel si cystites post-coïtales
Colonisation urinaire de la femme enceinte	
Pas de traitement probabiliste, traitement d'emblée adapté à l'antibiogramme amoxicilline	7 jours
Cystite aiguë de la femme enceinte	
Traitement probabiliste fosfomycine-trométamol	Prise unique
En cas d'échec ou de résistance amoxicilline	7 jours

1. Nitrofurantoïne : contre-indication en cas d'insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire < 45 ml/min ou de traitements itératifs

Pyélonéphrite aiguë simple (aucun facteur de risque de complication)	
Traitement probabiliste en attendant l'antibiogramme En l'absence de traitement par quinolone dans les 6 mois : ciprofloxacine ou lévofloxacine	Jusqu'au résultat de l'antibiogramme
Traitement de relais amoxicilline (à utiliser prioritairement sur souche sensible) Sinon désescalade pour la molécule active avec le spectre le plus étroit	10 jours
Pyélonéphrite aiguë à risque de complications (sans signe de gravité)	
Traitements antibiotiques, probabilistes ou de relais : ce sont ceux de la PNA simple, sans signe de gravité	10 jours

Infections ORL de l'adulte

Otite moyenne aiguë purulente	
amoxicilline	5 jours
Sinusite maxillaire aiguë purulente (suspicion d'infection bactérienne)	
amoxicilline	7 jours
Sinusite maxillaire unilatérale associée à une infection dentaire	
amoxicilline-acide clavulanique	7 jours
Sinusite frontale, éthmoïdale, sphénoïdale	
Avis ORL sans retarder la mise en place du traitement antibiotique	
amoxicilline-acide clavulanique	7 jours
Sinusite grave, à risque de complications	
Hospitalisation en urgence pour un avis spécialisé	
	-
Rhinopharyngite aiguë	
Pas d'antibiotique	-
Angine aiguë	
Score de Mac Isaac < 2 ou score de Mac Isaac ≥ 2 et test de diagnostic rapide négatif	
Pas d'antibiotique	-
Score de Mac Isaac ≥ 2 et test de diagnostic rapide positif	
amoxicilline	6 jours

Infections ORL de l'enfant

Otite moyenne aiguë (OMA) congestive ou séro-muqueuse	
Pas d'antibiotique	-
OMA purulente : enfant < 3 mois	
Avis spécialisé	
	-
OMA purulente : enfant de 3 mois à 2 ans	
amoxicilline	10 jours
OMA purulente : enfant > 2 ans avec symptômes modérés	
Pas d'antibiotique en 1 ^{re} intention	Réévaluation à 48/72h
OMA purulente : enfant > 2 ans avec symptômes importants	
amoxicilline	5 jours
si otorrhée ou otite récidivante : amoxicilline	10 jours
Sinusite maxillaire non liée à une origine dentaire ou frontale aiguë	
amoxicilline	10 jours
Sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire	
amoxicilline-acide clavulanique	10 jours

...

Sinusite ethmoïdale, sphénoïdale, ou frontale compliquée	
Avis spécialisé : ORL ou pédiatrique en urgence	-
Rhinopharyngite aiguë	
Pas d'antibiotique	-
Angine aiguë	
Enfant < 3 ans et enfant ≥ 3 ans et test de diagnostic rapide négatif	-
Pas d'antibiotique	-
Enfant ≥ 3 ans et test de diagnostic rapide positif	6 jours
amoxicilline	

Infections respiratoires basses

Coqueluche Nourrisson et Enfant [2024]	
Nourrisson < 3 mois	
Hospitalisation	
Clarithromycine	7 jours
ou azithromycine	3 jours
Nourrisson ≥ 3 mois et enfant	
Clarithromycine	7 jours
ou azithromycine	3 jours
Coqueluche Adulte [2024]	
Clarithromycine	7 jours
ou azithromycine	3 jours
Exacerbation de BPCO (EABPCO)	
En absence de facteurs de risque d'échec thérapeutique ou de complication	5 jours maximum
amoxicilline	
En cas de facteurs de risque d'échec thérapeutique ou de complication	5 jours maximum
amoxicilline-acide clavulanique	

Infections bactériennes cutanées

Dermohypodermites bactériennes non nécrosantes (DHBNN) chez l'adulte	
DHBNN non compliquée	7 jours.
amoxicilline	Ne pas prolonger l'antibiothérapie
Plaie par morsure animale	7 jours
amoxicilline-acide clavulanique	
Prévention des récurrences	Toutes les 2 à 4 semaines
Antibioprophylaxie : benzyl-pénicilline G retard 2,4 MUI IM	
Dermohypodermites bactériennes non nécrosantes (DHBNN) chez l'enfant	
Pas d'antibiothérapie locale	7 jours
amoxicilline-acide clavulanique	
Abcès cutanés	
Traitement chirurgical	-
Incision/drainage chirurgical	
Traitement médical	5 jours
clindamycine ou pristinamycine	
Furonculose	
Traitement de la poussée	7 jours
clindamycine ou pristinamycine	
Décolonisation des gîtes	7 jours
mupirocine en application nasale	
Furoncle isolé et non compliqué chez l'adulte et chez l'enfant	
Ne pas traiter par antibiothérapie locale ou générale	-
Furoncle compliqué ou à risque de complications	
Adulte	5 jours
clindamycine ou pristinamycine	

Enfant amoxicilline-acide clavulanique	5 jours
Impétigos localisés ou peu étendus	
Pas d'antibiothérapie par voie générale Antibiothérapie locale : mupirocine	5 jours
Formes graves d'impétigo (rares)	
Antibiothérapie par voie générale recommandée → À réévaluer selon résultats des prélèvements bactériologiques. Ne pas associer d'antibiothérapie locale	
Adulte pristinamycine	7 jours
Enfant amoxicilline-acide clavulanique	7 jours

Infection par *Helicobacter pylori* chez l'adulte

1. Traitement probabiliste de 1^{re} intention : traitement concomitant	
<ul style="list-style-type: none"> • IPP • et amoxicilline • et clarithromycine • et métronidazole 	14 jours
Ou en cas de prise antérieure de macrolides ou allergie à l'amoxicilline: traitement concomitant	
<ul style="list-style-type: none"> • oméprazole • et Pylera® (sous-citrate de bismuth + métronidazole + tétracycline) 	10 jours
2. Traitement guidé : souche sensible à la clarithromycine: traitement concomitant	
<ul style="list-style-type: none"> • IPP • et amoxicilline • et clarithromycine 	10 jours
3. Traitement guidé : souche résistante à la clarithromycine: traitement concomitant	
Souche sensible à la lévofloxacine	Souche résistante à la lévofloxacine
<ul style="list-style-type: none"> • IPP • et amoxicilline • et lévofloxacine 	<ul style="list-style-type: none"> • oméprazole • et Pylera® (sous-citrate de bismuth + métronidazole + tétracycline)
	10 jours

Diverticulite aiguë sigmoïdienne non compliquée

Traitement sans antibiotique	
En l'absence de signes de gravité Traitement symptomatique sans antibiotique recommandé	-
Antibiothérapie par voie orale	
En cas de non-réponse au traitement symptomatique amoxicilline-acide clavulanique	7 jours
En cas d'allergie ciprofloxacine ou lévofloxacine	7 jours

Urétrites et cervicites non compliquées

Traitement antibiotique probabiliste associant			
Traitement antigonococcique		Traitement anti- <i>Chlamydiae</i>	
ceftriaxone	Une seule injection	doxycycline ou azithromycine	7 jours Dose unique

Ce document présente les points essentiels de la publication :
Choix et durées d'antibiothérapie préconisées dans les infections bactériennes courantes - Juillet 2021
Mise à jour août 2024

Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr



Développer la qualité dans le champ
sanitaire, social et médico-social